Evaluación de las asociaciones de peces arrecifales en el oeste del litoral de La Habana, zona noroccidental de Cuba

Evaluation of reef fish assemblages in the west coast of Havana, north-western zone of Cuba

Alain García-Rodríguez*, Ariagna Lara Lorenzo* y Naima González Rodríguez

*Instituto de Oceanología, Ave. 1ra. No. 18406, entre 184 y 186, Rpto. Flores, La Habana 11600, Cuba.

e-mail: arodriguez@oceano.inf.cu, alain.garcia2285@gmail.com, ariagna@oceano.inf.cu

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Dr. Rodolfo Claro Madruga por la revisión del manuscrito y por sus sugerencias, así como al técnico Jorge Luis Hernández por su participación en los muestreos.

Resumen

Se realizó una evaluación rápida de las asociaciones de peces en el sector oeste del litoral norte de La Habana, el cual está sometido a un alto nivel de estrés ambiental. Se hicieron censos visuales mediante transeptos lineales en siete estaciones de dicha zona, en cada una de ellas se realizaron 6 réplicas de 50 m de largo por 2 m de ancho, siguiendo la metodología AGRRA. Los valores más bajos de densidad y biomasa se encontraron en las estaciones situadas al este del área de estudio (La Puntilla, calle 70 y calle 180), las cuales están más afectadas por la contaminación. La ictiofauna en todo el sector se caracterizó por una baja densidad, biomasa y talla de peces depredadores (pargos, meros, jureles, etc.) y herbívoros (fundamentalmente loros), al parecer relacionada con los efectos de la contaminación y la pesca excesiva en el área.

Abstracts

A rapid assessment of fish assemblages was conducted in the west sector of Havana north coast, which is exposed to a high level of environmental stress. Visual census by line transects were done at seven stations of that area. At each site, 6 transects 50 m long and 2 m wide were made, following AGRRA methodology. The stations located east of the study area (La Puntilla, 70 street and 180 street) presented the lowest values of density and biomass, being the most polluted sites. The ichthyofauna of the studied area was characterized by low density, biomass and size of predator fishes (snappers, groupers, jacks, and others) and herbivores (mainly parrotfishes), probably as a result of pollution and overfishing.

Palabras claves: peces de arrecife, abundancia, contaminación, Cuba.

Key words: reef fish, abundance, pollution, Cuba.

INTRODUCCIÓN

Los peces constituyen el principal recurso alimentario de mares y océanos (77% del total de los productos pesqueros; Claro, 2007) y su abundancia es muy afectada por impactos humanos tales como la sobrepesca y la contaminación. Usualmente la sobrepesca disminuye la abundancia de las especies comerciales de mayor talla (Myers & Worm, 2003; Hawkins & Roberts, 2004; Chevalier & Cárdenas, 2005a, b; Angulo *et al.*, 2007; Claro *et al.*, 2007, Stevenson *et al.*, 2007), lo que puede traer consigo un predominio de especies de pequeño tamaño y nivel trófico bajo (Aguilar, 2005). Además la disminución en la densidad de los peces herbívoros puede facilitar un crecimiento excesivo de las algas en los arrecifes (Aronson y

Precht, 2000; Lirman, 2001; Mumby, 2006; Alcolado, 2007a; McField & Kramer, 2007; Cheal *et al.*, 2010), lo que es perjudicial para los mismos. También la contaminación puede afectar o influir en la abundancia de los peces (Aguilar & González-Sansón, 2002; Guidetti *et al.*, 2002; Aguilar *et al.*, 2007; Azzurro *et al.*, 2010).

El litoral oeste de La Habana está sometido a un alto nivel de estrés ambiental, por el vertimiento directo de aguas albañales sin tratamiento previo hacia la zona costera y el aporte de nutrientes de los ríos Quibú y Almendares (Rodas *et al.*, 1998; Rodas *et al.*, 2004).

En años anteriores en la zona costera de esta región, se han desarrollado trabajos que incluyen inventarios y evaluaciones de las asociaciones de peces (Aguilar *et al.*, 2000; González-Sansón & Aguilar, 2000; Aguilar & González-Sansón, 2002; González-Sansón & Aguilar, 2003; Aguilar *et al.*, 2004; Aguilar, 2005; Hernández *et al.*, 2006; Aguilar & González-Sansón, 2007; Durán & Claro, 2009; González-Sansón *et al.*, 2009a; González-Sansón *et al.*, 2009b; González-Sansón & Aguilar, 2010). Esos estudios evidenciaron variaciones en la composición de la ictiofauna relacionadas con efectos de la contaminación y/o la pesca no comercial. Por ello, se propuso realizar una evaluación rápida de las asociaciones de peces en el litoral oeste de La Habana, para así determinar el estado de salud actual de la ictiofauna, como parte de un proyecto orientado a diagnosticar la calidad ambiental del área y establecer una línea base para evaluar los futuros cambios por factores antrópicos y naturales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Descripción de la zona de estudio

El área de trabajo abarca un sector frente a la costa del litoral occidental de La Habana, comprendido entre la desembocadura del río Almendares y la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), esta última fuera del área de influencia directa de los residuales de la ciudad y ubicada en el Municipio Bauta (Provincia Artemisa) (Figura 1).

Se establecieron siete estaciones de muestreo a 10 m de profundidad, estas fueron identificadas tomando como referencia los puntos más conocidos de la costa (Tabla 1).

En la mayoría de los sitios los muestreos fueron realizados sobre la terraza superior del veril, excepto en Calle 180 y ELAM donde el fondo era de camellones y canales. Los muestreos se realizaron del 14 al 17 de septiembre del 2009.

El supralitoral de esta área se caracteriza por ser rocoso con escasa presencia de playas. Frente a éste se desarrolla un arrecife de coral continuo del tipo costero según la nomenclatura de Zlatarski & Martínez-Estalella (1980).

Figura 1. Ubicación de las estaciones de muestreo en el litoral oeste de La Habana, Cuba. Pu = Puntilla, C70 = Calle 70, C180 = Calle 180, Ja = Jaimanitas, MH = Marina Hemingway, BSA = Bajo Santa Ana y ELAM = Escuela Latinoamericana de Medicina.

Figure 1. Location of sampling sites on the west coast of Havana, Cuba. Pu = Puntilla, C70 = 70 street, C180 = 180 street, Ja = Jaimanitas, MH = Marina Hemingway, BSA = Bajo Santa Ana, and ELAM = Latin-American School of Medicine.

Al este del área de estudio se encuentran las estaciones Pu, C70 y C180, cerca de la desembocadura de los ríos Almendares y Quibú, cuyas aguas son fuente de contaminantes (CIGEA, 2004; GEOCUBA, 2004). Además el emisario submarino que recibe los residuales que transporta el colector principal del alcantarillado del Municipio Playa, sufrió una fractura total a solo 12 m de profundidad en la misma desembocadura del río Almendares y presenta varias fugas de desechos por las uniones de los tubos. En el río Quibú, según Delgado (2007) vierten sus residuales 42 fuentes contaminantes y además se suman los residuales urbanos sin tratamiento previo de gran parte de la población del municipio de Marianao. También el emisario submarino que recibe los residuales albañales del Reparto Flores, municipio Playa presenta una avería a 6 m de profundidad (Alcolado-Prieto *et al.*, 2010). Todo esto causa un gran estrés ambiental sobre todo en las estaciones Pu y C180.

En el oeste del área de estudio (estaciones: Ja, MH, BSA y ELAM) se encuentra el río Jaimanitas, cuyas aguas reciben residuales de industrias y lagunas de oxidación, los cuales se incorporan posteriormente a las aguas que bañan el litoral (Alcolado *et al.*, 2010). También el río Santa Ana es fuente de contaminantes. Por otro lado, hay aportes de residuos no tratados en los drenajes del poblado de Santa Fe y del lugar conocido por "La Isla" ubicado dentro de la Marina Hemingway (Delgado, 2007). Además, la Escuela Latinoamericana de Medicina es uno de los emisores de aguas albañales de la cuenca este del litoral norte de la provincia Artemisa (CIGEA, 2004). Parte de esta carga de contaminantes se reduce por pre-tratamiento de los residuales antes de su llegada al mar a través de un emisario, que en la actualidad está destruido (Perigó, 2006).

Tabla 1. Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo. (Abreviaturas igual que en la Figura 1)
Table 1. Geographic location of sampling sites. (Abbreviations like in Figure 1)

Estación	Coordenadas
	(Latitud <u>N</u> - Longitud <u>O</u>)
Pu	23° 08' 13" - 82° 24' 77"
C70	23° 6' 92" - 82° 26' 41"
C180	23° 5' 83" - 82° 28' 3"
Ja	23° 5' 44" - 82° 29' 31"
MH	23° 5' 36" - 82° 30' 36"
BSA	23° 4' 44" - 82° 31' 59"
ELAM	23° 3' 88" - 82° 32' 69"

Método de muestreo

Se realizaron censos visuales con buceo autónomo (SCUBA) en el arrecife frontal, a 10 m de profundidad, en las siete estaciones del litoral de la provincia La Habana. En cada una de ellas se hicieron seis réplicas mediante transeptos lineales de 50 m de largo por 2 m de ancho, siguiendo el método I del protocolo AGRRA (2000) basado en la selección de 63 especies consideradas indicadoras de la calidad del arrecife.

Las familias evaluadas fueron Acanthuridae (barberos), Scaridae (loros), Haemulidae (roncos), Lutjanidae (pargos), Serranidae (meros, solo *Epinephelus* spp., *Mycteroperca* spp. y *Cephalopholis* spp.), Pomacanthidae (chiviricas), Chaetodontidae (parches) y Balistidae (lijas, solo *Balistes vetula-cochino*, *B. capriscus-cochino* gris, *Melichthys niger-negrito*, *Aluterus scriptus*-lija trompa, *Cantherhines pullus*-lija colorada, *C. macrocerus*-lija de lunares blancos). Además, se incluyen las especies *Sphyrna barracuda* (picúa), *Caranx ruber* (cibí carbonero), *Bodianus rufus* (pez perro español), *Microspathodon chrysurus* (chopita de cola amarilla) y *Lachnolaimus maximus* (pez perro), las cuales pertenecen a la categoría Otros. No se contaron los juveniles menores de 5 cm de longitud pertenecientes a las familias Scaridae y Haemulidae. La identificación de las especies se realizó según las descripciones de Robins & Ray (1986) y Humann & Deloach (2002).

Procesamiento de datos

En cada transepto se anotaron las especies observadas, el número de individuos y la talla estimada en centímetros (cm) de cada uno de ellos. Los datos de talla fueron asignados a la categoría correspondiente dentro de las establecidas por AGRRA: 0-5, 6-10, 11-20, 21-30, 31-40 y >40 cm. Para cada estación (promedio de los seis conteos) y para las siete estaciones en su conjunto (promedio de todos los conteos realizados), se calcularon la densidad (ind/100m²) y biomasa (g/100m²) promedios ($\pm$ EE - error estándar) por familia y para el conjunto de especies utilizando las hojas de cálculo de Microsoft Excel® creadas por Kramer & Marks (2000). Se comprobó que los datos cumplieran con la normalidad y con la homogeneidad de varianzas mediante las pruebas Kolmogorov-Smirnov y Levene respectivamente. La significación estadística de las diferencias observadas en los valores medios de densidad y biomasa se verificó mediante el análisis de varianza (ANOVA unifactorial) y la prueba de comparaciones

múltiples de Student-Newman-Keuls utilizando el programa STATISTICA 7.0. En todos los casos se utilizó un nivel de significación de 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La biomasa promedio de las siete estaciones fue de $5918 \text{ g}/100\text{m}^2 (\pm 1021)$ y la densidad de 51 individuos/ $100\text{m}^2 (\pm 7)$, inferiores a los valores promedios estimados (biomasa: $12253 \text{ g}/100\text{m}^2$; densidad: $62 \text{ ind}/100\text{m}^2$) por Alcolado *et al.* (2009) en el arrecife frontal del área costera aledaña al polo turístico Santa Lucía, norte de Camagüey, Cuba. También el valor de biomasa fue menor que los obtenidos por Alcolado *et al.* (2001) en arrecifes frontales de las áreas protegida ($12178 \text{ g}/100\text{m}^2$) y no protegida ($7915 \text{ g}/100\text{m}^2$) del Archipiélago Jardines de la Reina, sureste de Cuba. Según la escala (cinco categorías) de bioindicadores de la ictiofauna para los arrecifes coralinos de Cuba y el Caribe (Alcolado & Durán, 2011) la biomasa obtenida es pobre, mientras que la densidad es clasificada como regular.

Se encontraron diferencias significativas entre las estaciones tanto en densidad ($F=12,8$; $p<0,05$) como en biomasa ($F=15,5$; $p<0,05$). La Puntilla presentó los valores más bajos de ambos parámetros, seguida de Calle 70 y Calle 180 (Figuras 2 y 3), aunque no se diferencia significativamente de estos últimos. Al analizar el bentos se obtuvo un comportamiento similar (Alcolado-Prieto *et al.*, 2010; datos obtenidos paralelamente a nuestra investigación), observándose en la Puntilla los menores valores de cubrimiento de coral vivo (3,3%), densidad de colonias de coral (0,2 colonias por metro lineal) y diámetro medio de colonias de corales (13,3 cm), evidenciando un menor desarrollo coralino y baja complejidad del sustrato e indicando un mayor deterioro de la salud del ecosistema arrecifal. Además en estudios anteriores realizados en la Puntilla por Alcolado & Herrera (1987) y Alcolado (2007b) se reportó que esta estación es la más contaminada teniendo en cuenta el análisis de indicadores biológicos.

Figura 2. Densidad promedio ($\pm$ error estándar) de peces por estación. (Abreviaturas de las estaciones igual que en la Figura 1). Las letras (a,b,c) muestran el resultado de la prueba SNK *a posteriori*, de manera que letras iguales indica no diferencias significativas.

Figure 2. Fish average density ($\pm$ standard error) per site. (Abbreviations of the sites like in Figure 1). Letters (a,b,c) indicate the SNK test result *a posteriori*, so that equal letters indicate significant non-differences.

La biomasa promedio mostró una clara diferencia entre las estaciones del este (La Puntilla, Calle 70 y Calle 180) y las del oeste (Jaimanitas, Marina Hemingway, Bajo Santa Ana y Escuela Latinoamericana de Medicina) del área de estudio, donde los valores más bajos están en las primeras. En cuanto a la densidad no existen diferencias significativas entre algunas estaciones del este y del oeste, sin embargo, esto puede deberse a la presencia en el oeste de especies de mayor talla (fundamentalmente pargos y roncós). Estas, aunque aportan considerablemente al valor de biomasa, son pocos individuos por unidad de área o están ausentes.

Figura 3. Biomasa promedio ($\pm$ error estándar) de peces por estación. (Abreviaturas de las estaciones igual que en la Figura 2)

Figure 3. Fish average biomass ($\pm$ standard error) per site. (Abbreviations of the sites like in Figure 2)

En el sector de estudio la abundancia de depredadores de mediana y gran talla (principalmente pargos y meros) fue muy baja, igualmente sucedió con peces herbívoros, como los loros (Tablas 2 y 3). Además las lijas estuvieron ausentes en la mayoría de las estaciones muestreadas, con la excepción de tres individuos de la especie *Melichthys niger* en ELAM.

Los herbívoros (loros y barberos) presentaron una densidad de 11,6 ind/100m² ($\pm$ 2,9) y una biomasa de 1301,1 g/100m² ($\pm$ 480,5), mayores a los valores estimados por Hidalgo *et al.* (2010) en arrecifes utilizados como sitios de buceo del Polo turístico de Santa Lucía (densidad: 6,9 ind/100m² y biomasa: 525,4 g/100m²). Sin embargo, estos mayores valores están dados principalmente por los barberos, pues los loros tuvieron valores más bajos en comparación con dicho estudio (densidad: 6,02 ind/100m² y biomasa: 487,1 g/100m²). No obstante, la biomasa de herbívoros fue menor a la reportada por Alcolado *et al.* (2009) para el arrecife frontal del Polo turístico de Santa Lucía (3544 g/100m²) y es clasificada como mala según la escala de Lang & Marks (2010), mientras que la densidad fue menor a la obtenida por Steneck & Lang (2003) en arrecifes de México (16 ind/100m²). Específicamente la abundancia de loros presentó un valor bajo comparada con la de arrecifes de la isla caribeña de Navassa (8,3 ind/100m²; Miller & Gerstner, 2002). Bajas densidades de peces herbívoros de la familia Scaridae también fueron encontradas por Caballero *et al.* (2003) en arrecifes del norte de las provincias Artemisa y La Habana y por Durán & Claro (2009) en La Habana.

Tabla 2. Densidad promedio de peces por familias. Los valores entre paréntesis corresponden al error estándar.

Table 2. Average fish density per families. Values between parentheses correspond to the standard error.

	Pu	C70	C180	Ja	MH	BSA	ELAM	Total
Chaetodontidae	2	4,2	2	4,3	2	2,2	1	2,5
	(0,8)	(0,5)	(0,9)	(0,7)	(0,5)	(0,4)	(0,4)	(0,3)
Pomacanthidae	0	1	1,3	3,7	1,7	1	1,7	1,5
		(0,4)	(1)	(0,7)	(1,7)	(0,4)	(0,4)	(0,3)
Lutjanidae	0	0	0,3	1	8,3	16,8	3,2	4,2
			(0,2)	(0,7)	(8,3)	(13,5)	(1,8)	(2,3)
Serranidae	1	1,3	0,5	0,7	3,2	2,5	1	1,5
	(0,4)	(0,6)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,7)	(0,8)	(0,3)
Scaridae	0,2	1,8	5	11	8	7,3	4,7	5,4
	(0,2)	(0,4)	(3,3)	(3,6)	(3,1)	(3,3)	(1,1)	(1)
Haemulidae	0	0	0,7	61	16,2	8	31	16,7
			(0,7)	(4,3)	(5,9)	(4)	(8,9)	(3,6)
Acanthuridae	5	13	12	37,5	29,8	19,8	7,3	17,8
	(2)	(2,5)	(3)	(8,5)	(10,2)	(10,2)	(1,9)	(2,9)
Balistidae	0	0	0	0	0	0	0,5	0,1
							(0,5)	(0,1)
Otros	1,2	0	0	9,5	1,7	2,8	0	2,2
	(0,6)			(3,8)	(0,8)	(1,1)		(0,7)

Los pargos y meros presentaron menores valores de densidad y biomasa (Tablas 2 y 3) que los obtenidos por Hidalgo *et al.* (2010) en arrecifes utilizados como sitios de buceo del Polo turístico Santa Lucía (pargos: densidad: 6,9 ind/100m², biomasa: 1181,3 g/100m², meros: densidad: 2,6 ind/100m², biomasa: 1079,04 g/100m²), en el caso de los meros su biomasa fue cuatro veces mayor a la obtenida en nuestro estudio. Además la densidad de meros fue similar a la reportada por Nuñez-Lara *et al.* (2003) en arrecifes de México (1,6 ind/100m²), ligeramente mayor a la de los arrecifes de Bahamas (<0,5 ind/100m²; Kramer *et al.*, 2003) y menor que en Navassa (2,7 ind/100m²; Miller & Gerstner, 2002), la cual es una isla deshabitada y donde el impacto de la pesca es considerado mínimo.

La densidad de pargos fue mayor a la obtenida en México (2,4 ind/100m²; Nuñez-Lara *et al.*, 2003) y menor que en arrecifes de Brasil (12,2 ind/100m²; Kikuchi *et al.*, 2003). La biomasa combinada de pargos y meros (583,4; $\pm$ 265,4 g/100m²) es denominada como mala según Lang & Marks (2010). La densidad de peces carnívoros en conjunto (roncos, pargos y meros) fue de 7,46 ind/100m² ($\pm$ 3,2) y la biomasa de 1164,9 g/100m² ($\pm$ 448,5), estos indicadores son clasificados como críticos según la escala de Alcolado & Durán (2011). De los pargos solamente se observaron tres especies (*Lutjanus apodus*-cají, *L. synagris*-biajaiba, *Ocyurus chrysurus*-rabirrubia), mientras que de los meros solo dos (*Cephalopholis fulva*-guatívere, *C. cruentata*-enjambre).

Otros carnívoros como la picúa y el pez perro estuvieron ausentes en todas las estaciones. Una ausencia casi total de los grandes peces depredadores también fue encontrada por Aguilar & González-Sansón (2007) entre la entrada del Puerto de La Habana y la calle 84 del barrio de

Miramar, La Habana. En cuanto a las tallas promedios de loros (9,01 cm, $\pm 0,9$), pargos (5,1 cm, $\pm 1,4$) y meros (13,5 cm, $\pm 4,9$), estas son denominadas como críticas según Alcolado & Durán (2011). Los bajos valores de densidad, biomasa y talla para los meros, pargos y loros indican que el área está influenciada por los efectos de la contaminación y de una intensa pesca no comercial.

La pesca que se realiza en esta área es la pesca submarina con arpón, la cual se ejerce selectivamente sobre los grandes depredadores y herbívoros del arrecife (Aguilar & González-Sansón, 2000; Aguilar *et al.*, 2000). A esto se le adiciona la utilización de redes de agalla por los pescadores (Aguilar, 2005), lo que ejerce un efecto adicional sobre las asociaciones de peces. Además, la ictiofauna de esta área es más vulnerable debido a que la plataforma es muy estrecha y los pescadores submarinos habituales conocen prácticamente cada cueva o refugio en toda el área y los visitan con una periodicidad alta (Aguilar & González-Sansón, 2007). No obstante, la pesca no parece ser la causa principal de la diferencia entre las regiones este y oeste, pues se supone una igual presión pesquera (pesca de subsistencia) en ambas áreas.

El factor que pudiera estar ejerciendo la mayor influencia es la contaminación tanto orgánica como inorgánica. En las últimas décadas debido al desarrollo urbanístico, industrial y turístico en la provincia La Habana, ha existido un incremento en los niveles de contaminantes que se vierten en zonas costeras, los cuales se incorporan al medio marino, fundamentalmente, a través de los ríos y por la descarga de emisarios de aguas negras (Delgado, 2007). Las descargas de aguas de albañal no tratadas pueden ser portadoras de una mezcla de sustancias tóxicas que afectan la salud de los peces y han sido consideradas como un factor importante que contribuye a la reducción de la diversidad de especies en el mundo (Amisah & Cowx, 2000; Alberto *et al.*, 2005).

Particularmente la región este del área de estudio está afectada directamente por los ríos Almendares y Quibú y existe un mayor número de instalaciones turísticas. Según Rodas *et al.* (2004) la Puntilla y Calle 180 son los más contaminados en comparación con el resto de los sitios evaluados, además los muestreos fueron realizados en la época de lluvias y por lo tanto hay un mayor escurrimiento, lo que aumenta el aporte de nutrientes de los ríos al mar. El río Almendares es uno de los cuerpos de agua más importantes de La Habana y al igual que el Quibú presenta grandes problemas de contaminación como consecuencia de la descarga de residuos industriales, domésticos y agrícolas (Dominguez *et al.*, 2003). En general, estos ríos al ser receptores de estos residuales, contribuyen a la eutrofización de las zonas costeras cercanas a sus desembocaduras. Entre las consecuencias de la eutrofización está el incremento de materia orgánica que se deposita en el fondo, produciendo un cambio en las características generales del mismo, una tendencia a la disminución en el contenido de oxígeno disuelto, principalmente en el agua cercana al fondo y la muerte o la huida, total o parcial de los peces demersales (Ærtebjerg *et al.*, 2001).

Otro factor que es determinante en las características de la ictiofauna de los arrecifes es la disponibilidad de refugios. Varios autores (Aburto-Oropeza & Balart, 2000; Claro *et al.*, 2001; Khalaf & Kochzius, 2002) han planteado que existe relación entre la estructura de las asociaciones de peces y la complejidad de los hábitats. Aguilar & González-Sansón (2002) encontraron una correlación positiva entre la densidad de corales, esponjas y gorgonias y la abundancia de peces, que apoya la dependencia entre la complejidad del sustrato y la abundancia de la ictiofauna. Esto parece estar en contradicción con los resultados obtenidos en Jaimanitas, donde se obtuvieron valores medios a bajos de los indicadores del bentos (Alcolado-Prieto *et al.*, 2010) y los mayores valores promedios de densidad y biomasa de peces. Estos altos valores fueron aportados por roncos y barberos (Tablas 2 y 3), peces que generalmente forman densas agrupaciones.

Tabla 3. Biomasa promedio por familia. Los valores entre paréntesis corresponden al error estándar
Table 3. Average fish biomass per families. Values between parentheses correspond to the standard error.

	Pu	C70	C180	Ja	MH	BSA	ELAM	Total
Chaetodontidae	108,8 (71,7)	164 (72,7)	74,8 (45,3)	93,8 (14,9)	83,5 (40,9)	86,8 (24,7)	27,9 (12,5)	91,4 (17,3)
Pomacanthidae	0	52,6 (28,2)	133,6 (128,1)	76,4 (27,3)	299,8 (299,8)	73,7 (42,9)	61,2 (30,4)	99,6 (46,1)
Lutjanidae	0	0	149,1 (94,3)	227,1 (146,7)	917,9 (917,9)	4380,8 (3948,1)	674,8 (447,4)	907,1 (584,7)
Serranidae	108,6 (48,6)	171,3 (98,8)	54,3 (54,3)	56,8 (53,9)	656,4 (156,7)	637,2 (189,9)	133 (86,9)	259,6 (54,8)
Scaridae	15,4 (15,4)	142 (30,8)	400,8 (362,2)	874,4 (390,4)	206,6 (56,5)	583,9 (421,9)	251,1 (33)	353,5 (99,7)
Haemulidae	0	0	45,6 (45,6)	7635 (897,3)	2567,4 (943,6)	983,6 (569,2)	5064,3 (1934,4)	2328 (535,8)
Acanthuridae	87,8 (57,1)	454,8 (191,6)	547,4 (263,3)	4467,2 (1132,6)	4241,8 (1621,5)	4998 (3349)	945,3 (236,5)	2248,9 (606)
Balistidae	0	0	0	0	0	0	11,7 (11,7)	1,7 (1,7)
Otros	11,6 (5,6)	0	0	302,6 (162)	94,3 (68,5)	309,6 (102,3)	0	102,6 (33,9)

CONCLUSIONES

Los valores más bajos de densidad y biomasa de peces se encontraron en los sitios más contaminados (La Puntilla, Calle 70 y Calle 180).

Los bajos valores de densidad, biomasa y talla obtenidos para las especies de meros (Serranidae), pargos (Lutjanidae) y loros (Scaridae), sugieren que el área estudiada está influenciada por una combinación de los efectos de la contaminación y de un esfuerzo excesivo de pesca.

REFERENCIAS

- Aburto-Oropeza, O. & Balart, F. E. (2001). Community structure of reef fish in several habitats of a rocky reef in the Gulf of California. *Mar. Ecol.*, 22(4), 283-305.
- Ærtebjerg, G., Carstensen, J., Dahl, K., Hansen, J., Nygaard, K., Rygg, B., Sørensen, K., Severinsen, G., Casartelli, S., Schrimpf, W., Schiller, C. & Druon, J. N. (2001). *Eutrophication in Europe's coastal waters*. Topic Report 7. Copenhagen: European Environment Agency.
- AGRRA, (2000). The AGRRA Rapid Assessment Protocol. Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment methodology. <http://coral.aoml.noaa.gov/agra/methodhome.htm>
- Aguilar, C. (2005). La ictiofauna costera de Ciudad de La Habana: Efectos acumulativos de agentes estresantes múltiples en varios niveles de organización biológica. Tesis presentada

en opción al grado científico de Doctora en Ciencias Biológicas. Ciudad de La Habana, 140pp.

Aguilar, C. & González-Sansón, G. (2000). Influencia de la contaminación de la bahía de La Habana (Cuba) sobre las asociaciones de peces costeros, 1. Abundancia y Diversidad. *Rev. Invest. Mar.*, 21(1-3), 60-70.

Aguilar, C. & González-Sansón, G. (2002). Ecología de la ictiofauna costera en la zona adyacente a la desembocadura del río Almendares (La Habana, Cuba). 1. distribución espacial de la abundancia y la diversidad. *Rev. Invest. Mar.*, 23(1), 3-14.

Aguilar, C. & González-Sansón, G. (2007). Composición de la ictiofauna costera de Ciudad de La Habana y evaluación preliminar de los factores que la determinan. *Rev. Invest. Mar.*, 28(1), 43-56.

Aguilar, C., González-Sansón, G., De la guardia, E., Suárez, M. A., Trelles, J. & Angulo, J. (2000). Inventario de los componentes más comunes de la flora y la fauna del arrecife de coral costero de la caleta de San Lázaro, región noroccidental de Cuba, en el período de 1996 a 1998. *Rev. Invest. Mar.*, 21(1-3), 53-59.

Aguilar, C., González-Sansón, G., Hernández, I., MacLatchy, L. D. & Munkittrick, R. K. (2007). Effects-based assessment in a tropical coastal system: Status of bicolor damselfish (*Stegastes partitus*) on the north shore of Cuba. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 67, 459-47.

Aguilar, C., González-Sansón, G., Munkittrick, R. K. & MacLatchy, L. D. (2004). Fish assemblages on fringe coral reefs of the northern coast of Cuba near Havana Harbor. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 58, 126-138.

Alberto, A. A., Camargo, F. M., Verani, R. J., Costa, T. F. O. & Fernández, M. N. (2005). Health variables and gill morphology in the tropical fish from a sewage-contaminated river. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 61(2), 247-255.

Alcolado, M. P. (2007a): Diversidad ecológica. Diversidad, utilidad y estado de conservación de los biotopos marinos. En R. Claro (ed.), *La Biodiversidad marina de Cuba* (CD-ROM, pp. 13-59). La Habana, Cuba: Instituto de Oceanología y Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Alcolado, M. P. (2007b). Reading the code of coral reef sponge community composition and structure for environmental biomonitoring: some experiences from Cuba. En M. R. Custódio, G. Lobo-Hajdu, E. Hajdu y G. Muricy (Eds.), *Porifera Research: Biodiversity, Innovation and Sustainability* (pp. 3-10). Rio de Janeiro: Museu Nacional.

Alcolado, M. P. & Durán, A. (2011). Sistema de escalas para la clasificación y puntaje de condición del bentos e ictiofauna de arrecifes coralinos de Cuba y del Gran Caribe. *Serie Oceanológica*, 8, 25-29.

Alcolado, M. P. & Herrera-Moreno, A. (1987). Efectos de la contaminación sobre las comunidades de esponjas en el Litoral de La Habana, Cuba. *Rep. Invest. Inst. Oceanol.*, Acad. Cien. Cuba, 68, 1-17.

Alcolado, M. M., P., Busutil, L. L., Rey-Villiers, N., Castellanos, I. S., Alcolado-Prieto, P., Hidalgo, R. G., Macías, D. & Muñoz, H. D. (2010). Biomonitorio de los arrecifes coralinos entre los ríos Quibú y Baracoa, y prueba de nuevos indicadores ambientales potenciales a partir de comunidades sésiles. Informe de proyecto, Programa: Diversidad Biológica. Instituto de Oceanología, CITMA., La Habana. 84pp.

Alcolado, M. P., de la Guardia, E., Pina, F., Cantelar, K., González, S., Caballero, H., Cerdeira, S., Lorenzo, S. Hernández, M., Hernández, L. J., Ginsburg, N. R., Lang, C. L., Kramer, A. K.,

- Marks, W. K., Rodríguez, A. E., Andre-Fouet, S. & Zlatarski, V. (2001). Estado de salud de los arrecifes coralinos del Archipiélago Jardines de la Reina (SE de Cuba). Expedición CUBAGRRA II. Archivo científico del Instituto de Oceanología, Cuba. 37pp.
- Alcolado, P. M., Martínez, B., Caballero, H., Hidalgo, G., Busutil, L., Durán, A. & Lake, J. J. (2009). Informe final de Biología Marina para la 1ra. Etapa del Proyecto: Gestión ambiental de la zona costera como contribución a la sostenibilidad del desarrollo turístico en Santa Lucía, Camagüey. Archivo Científico del Instituto de Oceanología, CITMA, La Habana. 22pp
- Alcolado-Prieto, A., Busutil, L., Lara, A., González-Rodríguez, N. & Hernández, J. L. (2010). Evaluación del estado de salud de comunidades de corales y las poblaciones de peces del oeste del litoral habanero, Cuba. Informe final del Proyecto: Calidad Ambiental de la Zona Costera al Oeste de Ciudad de La Habana (CACHA), Instituto de Oceanología. 23pp.
- Amisah, S. & Cowx, G. I. (2000). Response of the fish populations of the River Don in South Yorkshire to water quality and habitat improvements. *Environ. Poll.*, 108, 191–199.
- Angulo, V. A. J., Acevedo, R. B., Hernández, R. B. & González-Sansón, G. (2007). Effects of tourism activities on coral reef communities in the Punta Frances National Marine Park, Cuba. *Rev. Invest. Mar.*, 28(2), 159-175.
- Aronson, B. R. & Precht, W. F. (2000). Herbivory and algal dynamics on the coral reef at Discovery Bay, Jamaica. *Limnol. Oceanogr.*, 45(1), 251-255.
- Azzurro, E., Matiddi, M., Fanelli, E., Guidetti, P., Scarpato, A. M. G. & Axiak, V. (2010). Sewage pollution impact on Mediterranean rocky-reef fish assemblages. *Mar. Environ. Res.*, doi:10.1016/j.marenvres.2010.01.006.
- Caballero, H., Chevalier, P. P., Varona, G., Cárdenas, L. A., Ravelo, J. & García, Y. (2003). Caracterización ecológica de las principales zonas de colecta del Acuario Nacional para el mantenimiento óptimo de sus exhibiciones vivas. Informe final de proyecto de investigación ramal de ciencia y técnica. Código 2048, Acuario Nacional de Cuba. 43pp.
- Cheal, J. A., Aaron-MacNeil, M., Cripps, E., Emslie, J. M., Jonker, M., Schaffelke, B. & Sweatman, H. (2010). Coral–macroalgal phase shifts or reef resilience: links with diversity and functional roles of herbivorous fishes on the Great Barrier Reef. *Coral Reefs*, 29, 1005–1015.
- Chevalier, P. P. & Cárdenas, A. L. (2005a). Variación espacial y temporal de las asociaciones de peces en arrecifes costeros de la costa oriental de la Bahía de Cochinos. I: Abundancia y Diversidad. *Rev. Invest. Mar.*, 26(1), 45-57.
- Chevalier, P. P. & Cárdenas, A. L. (2005b). Variación espacial y temporal de las asociaciones de peces en arrecifes costeros de la costa oriental de la Bahía de Cochinos. II: Análisis multidimensional. *Rev. Invest. Mar.*, 26(1), 59-66.
- CIGEA, (2004). Resumen de Cargas Contaminantes de Cuencas Hidrográficas de Cuba. Soporte magnético. Centro de Inspección y Gestión Ambiental, CITMA.
- Claro, R. (2007). Diversidad de organismos. Filo Chordata, peces - Subfilos Cephalochordata (Acrania) y vertebrata (Craniata). En R. Claro (ed.), *La Biodiversidad marina de Cuba* (CD-ROM, pp. 60-109). La Habana, Cuba: Instituto de Oceanología y Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
- Claro, R., Cantelar, K., Pina-Amargós, F. & García-Arteaga, J. P. (2007). Cambios en las comunidades de peces de los arrecifes coralinos del archipiélago Sabana-Camagüey, Cuba. *Biol. Trop.*, 55(2), 537-547.
- Claro, R.; Lindeman, C. K. y Parenti, R. L. (eds.). (2001). *Ecology of the marine fishes of Cuba*.

Washington y London: Smithsonian Institution Press.

- Delgado, G. Y. (2007). Peligro, vulnerabilidad y riesgo ante la contaminación fecal en el litoral oeste de Ciudad de La Habana. Tesis en opción al grado de Máster en Ciencias Biológicas. Academia de Ciencias de Cuba. 65pp.
- Domínguez, J., Borroto, J.; Hernández, A. & Santiago, F. J. (2003). Empleo de modelos matemáticos en la predicción de parámetros de calidad del río Almendares. *Contribución a la educación y la protección ambiental*, 4, 287-294
- Durán, A. & Claro, R. (2009). Actividad alimentaria de los peces herbívoros y su impacto en arrecifes con diferente nivel de degradación antrópica. *Rev. Biol. Trop.*, 57(3), 687-697.
- Geocuba, (2004). Estudio de Impacto ambiental. Dragado Desembocadura Río Almendares. Informe Final, Geocuba, Estudios Marinos. 30pp.
- González-Sansón, G & Aguilar, C. (2000). Influencia de la contaminación de la Bahía de La Habana (Cuba) sobre las asociaciones de peces costeros, 2. Análisis multidimensional. *Rev. Invest. Mar.*, 21(1-3), 60-70.
- González-Sansón, G. & Aguilar, C. (2003). Variaciones espaciales y temporales en la abundancia de las especies dominantes de peces de arrecife de coral en la costa de Ciudad de la Habana, Cuba. *Rev. Invest. Mar.*, 24(2), 99-110.
- González-Sansón, G. & Aguilar, C. (2010). Reef fish diversity components as indicators of cumulative effects in a highly impacted fringe reef. *Ecological Indicators*, 10, 766–772.
- González-Sansón, G., Aguilar, C., Hernández, I., Cabrera, Y., Suarez-Montes, N., Bretos F. & Guggenheim, D. (2009a). Natural and human-induced variability in the composition of fish assemblages in the Northwestern Cuban shelf. *Rev. Biol. Trop.*, 57(3), 721-740.
- González-Sansón, G., Aguilar, C., Hernández, I., Cabrera, Y. & Curry, A. R. (2009b). The influence of habitat and fishing on reef fish. *Gulf and Caribbean Research*, 21, 13-21.
- Guidetti, P., Fanellib, G., Frascchetti, S., Terlizzia, A. & Boeroa, F. (2002). Coastal fish indicate human-induced changes in the Mediterranean littoral. *Mar. Env. Res.*, 53, 77–94.
- Hawkins, P. J. & Roberts, C. M. (2004). Effects of Artisanal Fishing on Caribbean Coral Reef. *Conservation Biology*, 18(1), 215-226.
- Hernández, I., Aguilar, C. & González-Sansón, G. (2006). Variaciones en la abundancia de peces en sitios con diferente grado de contaminación del sublitoral de Ciudad de La Habana, Cuba. *Rev. Biol. Trop.*, 57(4), 977-992.
- Hidalgo, R. G., López, B. L., Alcolado-Prieto, P., Rey-Villier, N., Alcolado-Menéndez, P. & Chevalier, P. (2010). Condición del bentos y peces en nueve sitios de buceo del Polo Turístico de Santa Lucía (Camagüey, Cuba). Informe del proyecto: Gestión Ambiental de la zona costera como contribución a la sostenibilidad del desarrollo turístico en Santa Lucía, Camagüey. Ministerio de ciencia, tecnología y medio ambiente, Instituto de Oceanología. 24pp.
- Humann, P. & Deloach, N. (2002). *Reef fish identification (Florida-Caribbean-Bahamas)*. 3rd ed. New World Publications.
- Khalaf, M. A. & Kochzius, M. (2002). Community structure and biogeography of shore fishes in the Gulf of Aqaba, Red Sea. *Helgol. Mar. Res.*, 55, 252–284.
- Kikuchi, P. K. R., Leao, M. A. N. Z., Sampaio, S. L. C. & Telles, D. M. (2003). Rapid assessment Abrolhos reefs, eastern Brazil (Part 2: fish communities). En J.C. Lang (ed.), *Status of Coral Reefs in the western Atlantic: Results of initial Surveys, Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment (AGRRA) Program* (pp. 188-203). Washington, CC, USA: National Museum of

Natural History Smithsonian Institution.

- Kramer, P y Marks, K (2000). The AGRRA Rapid Assessment Protocol. Hoja para el cálculo de los datos primarios. Instituto de Oceanología. Formato digital.
- Kramer, A. P., Mark, W. K. & Turnbull, L. T. (2003). Assessment of the Andros Island Reef System, Bahamas (Part 2: fishes). En J.C. Lang (ed.), *Status of Coral Reefs in the western Atlantic: Results of initial Surveys, Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment (AGRRA) Program* (pp. 100-124). Washington, CC, USA: National Museum of Natural History Smithsonian Institution.
- Lang, C. J. & Marks, K. (2010). Indicadores de la salud del arrecife. En González, J. M., Saavedra, C., Fairweather, M. I., Bood, N., Gibson, J., Secaira, F., Kaufman, L., Kramer, P. & Paul, V. (Eds.). *Reporte de la salud ecológica del Arrecife Mesoamericano* (pp. 4-7). Franklin Communications.
- Lirman, D. (2001). Competition between macroalgae and corals: effects of herbivore exclusion and increased algal biomass on coral survivorship and growth. *Coral Reefs*, 19, 392-399.
- McField, M. & Kramer, R. P. (2007). *Arrecifes Saludables para Gente Saludable: Guía de indicadores de salud de los arrecifes y bienestar social en la región del Sistema Arrecifal Mesoamericano*. Con las contribuciones de M. Gorrez y M. McPherson. The Smithsonian Institution.
- Miller, W. M. & Gerstner L. C. (2002). Reefs of an uninhabited Caribbean island: fishes, benthic habitat, and opportunities to discern reef fishery impact. *Biological Conservation*, 106, 37-44.
- Mumby, J. P. (2006). The impact of exploiting grazers (Scaridae) on the dynamics of Caribbean coral reefs. *Ecological Applications*, 16(2), 747-769.
- Myers, R. A. & Worm, B. (2003). Rapid worldwide depletion of predatory fish communities. *Nature*, 423, 280-283.
- Núñez-Lara, E., González-Salas, C., Ruiz-Zárate, A. M., Hernández-Landa, R. & Arias-González, E. J. (2003). Condition of coral reef ecosystems in the central-southern Quintana Roo, Mexico (Part 2: reef fish communities). En J.C. Lang (ed.), *Status of Coral Reefs in the western Atlantic: Results of initial Surveys, Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment (AGRRA) Program* (pp. 338-360). Washington, CC, USA: National Museum of Natural History Smithsonian Institution.
- Perigó, E. (2006). Identificación actualizada de las principales fuentes de contaminación y otras presiones antropogénicas de la calidad ambiental de la zona costera de playa Baracoa. Informe del Proyecto de Diagnóstico Ambiental de la Zona Marino Costera de Baracoa para su Rehabilitación y Manejo. 10pp.
- Robins, C. R. & Ray, G. C. (1986). *A Field Guide to Atlantic Coast Fishes, North America*. Boston: Houghton Mifflin Co.
- Rodas, F. L., Cerdeira, S., Areces, A., Montalvo, F. J., Loza, S., Del Valle, R., Delgado, Y., Sosa, M., Rivas, L., Guerra, R., González, S., Marcos, Z., Gutiérrez, J., Lorenzo, S., García, I., Sánchez, M., Núñez, R., César, M., Esponda, S., Delgado, V., García, R., Hernández, L. J., Hernández, M. & Niévares, A. (2004). Situación ambiental del litoral nw de Ciudad de la Habana. Informe Final del Proyecto Calidad Ambiental de la Zona Costera al Oeste de Ciudad de la Habana (CACHA). Instituto de Oceanología, CITMA., La Habana. 70pp.
- Rodas, L., García, G., García, R. & Niévares, A. (1998). Las corrientes marinas y la dispersión de residuales: dos parámetros esenciales para la construcción del emisario submarino del reparto Flores. *Contribución a la educación y protección ambiental*, 130-134.

- Steneck, R. S. & Lang, C. J. (2003). Rapid assessment of Mexico's Yucatan Reef in 1997 and 1999: pre- and post- 1998 mass bleaching and Hurricane Mitch (stony corals, algae and fishes). En J.C. Lang (ed.), *Status of Coral Reefs in the western Atlantic: Results of initial Surveys, Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment (AGRRA) Program* (pp. 294-318). Washington, CC, USA: National Museum of Natural History Smithsonian Institution.
- Stevenson, C., Katz, L. S., Micheli, F., Block, B., Heiman, W. K., Perle, C., Weng, K, Dunbar, R. & Witting, J. (2007). High apex predator biomass on remote Pacific islands. *Coral Reefs*, 26, 47–51.
- Zlatarsky, V. & Martínez-Estalella, N. (1980). *Scleractinians of Cuba, with data on associated organisms*. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences Press.

Recibido: enero de 2012.

Aceptado: agosto de 2012.