

ALGUNOS TREMATODOS (DIGINEA) DE PECES MARINOS DEL NORTE DE COLOMBIA

Por

IMELDA VÉLEZ

RESUMEN

En un estudio que se hizo sobre los tremátodos digineos de los pargos (*Lutjanidae*) se tuvo la oportunidad de examinar peces marinos de otras familias. Los tremátodos digineos encontrados en estos últimos se describe y compara su distribución geográfica en el Mar Caribe. Se dan los ciclos de vida conocidos.

ABSTRACT

During a study of the digenea (Trematoda) of the snappers (*Lutjanidae*), there was an opportunity to examine marine fishes from other families. The trematodes found in the latter are here described along with their life cycles and their distributions in the Caribbean.

INTRODUCCION

Sobre la fauna de tremátodos en los peces marinos del Atlántico colombiano no existe ningún trabajo. Existen muchos trabajos al respecto en el Caribe especialmente en las Antillas, Panamá y Venezuela. En aguas aledañas al Caribe existen también bastantes informes, los más importantes en la Florida y México, que no dejan de relacionarse muy estrechamente. Estos trabajos datan ya desde fechas de finales del siglo pasado.

Los primeros reportes los da LINTON (1907, 1910) en Bermudas e Islas Tortugas, Florida, donde reporta un gran número de nuevas especies que se siguen reportando como típicas en el Mar Caribe. MANTER (1933,