

Tableau n° 9: Biomasse démersale apparente (et corrigée) du plateau continental mauritanien, évaluée par les campagnes du N/O N'DIAGO, de 1982 à 1988.

	NORD			SUD			PLATEAU		
	biomasse	b. corrigée	éc. type	biomasse	b. corrigée	éc. type	biomasse	b. corrigée	éc. type
Fev. Avri. 1982	23161	27793	10554	33903	40684	4027	57064	68477	11929
Juin. 1982	39740	47688	3527	56774	68129	7733	96514	115817	11262
Septembre. 1982	25555	30666	8759	35757	42908	5493	61312	73574	10330
Février. 1983	14070	16884	1995	44651	53581	5173	58721	70465	5553
Avri. Mai. 1983	17985	21582	8624	29499	35399	4347	47484	56981	9670
Septembre. 1983	14898	17878	3649	37967	45560	6107	52865	63438	7107
Décembre. 1983	12683	15220	3479	54426	65314	5483	67111	80533	6495
Avril. 1984	12794	15353	6325	27113	32536	2587	39997	47888	6835
Sept. Octo. 1986	10772		2708	24269		5521	35042		6136
Mars. Avri. 1987	12347		3074	36935		6174	49282		6887
Mars. Avri. 1987 °	13679		3354	45987		7841	59666		8524
Sept. Octo. 1987 °	23577		6269	43210		8201	67107		12593
Sept. Octo. 1987 *	21217		5642	36030		6939	57282		10746
Mars. Avri. 1988 °	26664		13200	62069		7823	88733		15344
Mars. Avri. 1988 *	23995		11879	51775		6525	57741		13098
Mai. 1988 °	20883		7524	53820		8504	74703		11354
Mai. 1988 *	18793		6771	44877		7091	63766		9692
Août. 1988 °	22672		8688	49482		7317	72154		11359
Août. 1988 *	20402		7818	41260		6101	61590		9696
Sept. Octo. 1988 °	17882		10518	53354		8616	71156		13596
Sept. Octo. 1988 *	16020		9464	44505		7187	60736		11605

° avec double poche de 60 mm

\* recalculé sans la double poche






Figure n° 24: Biomasse démersale apparente (et corrigée) du plateau continental mauritanien, évaluée par les campagnes du N/O N'DIAGO, de 1982 à 1988.

Annexe n° 1: plan du chalut irlandais utilisé durant les campagnes de chalutage du N/O N°DIAGO.





- fonds sablo-vaseux à plus de 80 m de profondeur ( strates 1 , 4 et 7 )

- fonds sablo-vaseux côtiers (strates 2, 5 et 8)

- fonds de sable côtier, à moins de 30m en zone nord ( strate 3 ) ; à moins de 15 mètres en zones centre et sud ( strates 6 et 9)

Annexe n° 2: Cartes des strates utilisées lors des campagnes de chalutage du N'DIAGO